

# KØREKORTREGLER

## for mennesker med diabetes



Kørekorttype	Behandling	Varighed af kørekort	Attestkrav
Lille kørekort (Gruppe 1 kørekort)	Diætbehandling	Op til 15 år	Lægeattest første gang man skal forny
	Medicin med ingen eller lille risiko for lavt blodsukker	Op til 5 år	Lægeattest
	Medicin med risiko for lavt blodsukker	Op til 5 år	Lægeattest. Diabetesattest, hvis ustabil sygdom eller komplikationer
Stort kørekort (Gruppe 2 kørekort)	Diætbehandling	Op til 5 år	Lægeattest
	Medicin med ingen eller lille risiko for lavt blodsukker	Op til 5 år	Lægeattest
	Medicin med risiko for lavt blodsukker	Op til 3 år	Lægeattest og Diabetesattest

Man anbefaler ikke Erhverv D1 eller D (lille eller stor bus til erhvervsmæssig personbefordring) eller mulighed for at føre udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har type 1.

Hvis du oplever tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har brug for hjælp fra andre (alvorlig hypoglykæmi), gælder der specielle regler. Se [diabetes.dk](http://diabetes.dk) under støtte og rettigheder, hvor du også kan se mere om reglerne.

Se bagsiden for kørekortkategorier og medicinliste.



### Lille kørekort (gruppe 1):

A, B, B/E samt førere af traktor/motorredskab

- Motorcykel (A)
- Almindelig bil (B)
- Almindelig bil med stort påhængskøretøj (B/E)
- Traktor/motorredskab (T/M)

### Stort kørekort (gruppe 2):

C, C/E, D1 og D/E samt førere af B og D anvendt til erhvervmæssig personbefordring samt kørelærere

- Lastbil (C)
- Lastbil med stort påhængskøretøj (C/E)
- Lille bus – maks. 8 meter lang og indrettet til befordring af maks. 16 personer (D1)
- Bus – stor personbil med over 8 siddepladser foruden føreren (D/E)
- Køretøjer anvendt til erhvervmæssig personbefordring (f.eks. taxi (B) og bus (D))
- Kørelærere

**Man anbefaler ikke Erhverv D1 eller D (lille eller stor bus til erhvervmæssig personbefordring) eller mulighed for at føre udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har type 1.**

### Lægemidler, som medfører risiko for hypoglykæmi af trafikikkerhedsmæssig betydning:

- Insulin og kombinationspræparater, der indeholder insulin.
- Betacelle-stimulerende midler (sulfonylurinstoffer og meglitinider): Glimepirid (Amaryl), gliclazid (Diamicron), glibenclamid (Daonil, Hexaglucon), repaglinid (NovoNorm) og nateglinide (Starlix).

### Lægemidler, som giver en lav eller ingen risiko for hypoglykæmi af trafikikkerhedsmæssig betydning:

- Biguanider: Metformin (for kombinationer, se nedenfor).
- Glitazoner (thiazolidinedioner): Pioglitazon (Actos, Pioglitazon).
- DPP-IV-hæmmere: Alogliptin (Vipidia), linagliptin (Trajenta), saxagliptin (Onglyza®, Qtern), sitagliptin (Januvia®, Xelevia) og vildagliptin (Galvus®, Jalra).
- DPP-IV-hæmmere i kombinationer: Alogliptin + pioglitazon (Incrasync), alogliptin + metformin (Vipdomet), linagliptin + metformin (Jentadueto), saxagliptin + metformin (Komboglyze), sitagliptin + metformin (Janumet®) og vildagliptin + metformin (Eucreas).
- SGLT-2-hæmmere: Canagliflozin (Invokana), dapagliflozin (Forxiga®) og empagliflozin (Jardiance).
- SGLT-2-hæmmere i kombinationer: Dapagliflozin + saxagliptin (Qtern), dapagliflozin + metformin (Xigduo) og empagliflozin + metformin (Synjardy).
- GLP-1-analoger: Dulaglutid (Trulicity), exenatid (Bydureon, Byetta), liraglutid (Victoza®, Saxenda), lixisenatid (Lyxumia).

